



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL : 170 F.

BULLETIN N° 01 DU 11 JANVIER 1991

Nouveau n° de téléphone du S.R.P.V. : 61.24.70.70 - N° d'appel direct de la Section "GRANDES CULTURES" : 61.24.70.33

Meilleurs vœux à tous nos abonnés

COLZA

Stades végétatifs

Les colzas sont dans l'ensemble au stade de la formation de la rosette, allant de 3 à 6/8 feuilles. Quelques rares parcelles à C1, reprise de végétation.

DESHERBAGE

Situation

On assiste, actuellement, à la levée de nombreuses mauvaises herbes, dicotylédones et graminées, dans les parcelles non désherbées à l'automne.

Préconisation

Les tableaux ci-après indiquent les herbicides utilisables.

Avant toute application d'un produit dans une parcelle, s'assurer toutefois de la possibilité de son utilisation par rapport au stade du colza.

HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVEE

Matières actives	Spécialités commerciales (Firmes)	Doses /ha	Observations
carbétamide	LEGURAME PM (RHODIAGRI-LITTORALE)	3 kg	Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application sur sol gelé. Essentiellement antigaminées.
		5 à 6 kg	Contre chiendent de Novembre à fin Janvier.
propyzamide	KERB Flo (ROHM ET HAAS)	1,25 l	A partir du stade 2 feuilles vraies du colza (B2) jusqu'à la reprise de végétation. Application sur sol gelé. Essentiellement antigaminées.
carbétamide + diméfuron	PRADONE TS (RHODIAGRI-LITTORALE)	3,5 kg	A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. Application possible sur sol gelé. Antidicotylédones et antigaminées.
diméfuron + clopyralid	CLERDONE (RHODIAGRI-LITTORALE)	2,5 l	Sur colza sain, bien enraciné (pivot > 10cm) à partir du stade 4 feuilles vraies du colza. Antidicotylédones. Ne pas utiliser en mélange avec un antigaminée à action foliaire ; respecter 10 jours d'intervalle entre les traitements. Mélange possible avec un antigaminée à action racinaire.
clopyralid	LONTREL SF 100 (SCHERING)	1,2 l	De la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux. Spectre : composées et légumineuses. S'emploie à la dose de 0,75 l à 1,25 l avec 3 l d'huile SCHERING.



LES ANTIGRAMINEES A ACTION FOLIAIRE SUR COLZA

Ils s'utilisent quel que soit le stade du colza, à partir du stade 3 feuilles des graminées. La végétation doit être active et la température comprise entre 10 et 20 ° pour une pénétration et une systémie optimale de la matière active. Contre les graminées vivaces, il est nécessaire de doubler les doses. La dose d'huile est modulable en fonction des conditions climatiques.

Matières actives	Spécialités commerciales (Firmes)	Doses /ha	Observations
aloxydime-sodium	FERVIN (SCHERING)	1 kg + 3 l huile SCHERING	Sur graminées annuelles
		1 à 1,25 kg + 3 l huile SCHERING	Sur graminées vivaces
sethoxydime	FERNAL (SCHERING)	2 l + 3 l huile SCHERING	Sur graminées annuelles
		3 l + 3 l huile SCHERING	Sur graminées vivaces
fluazifop p-butyl	FUSILADE X2 + AGRAL (SOPRA)	0,75 l + 0,1 % AGRAL	Sur graminées annuelles
		1,5 l + 0,1 % AGRAL	Sur graminées vivaces
quizalofop-éthyl isomère D	TARGA D+ (PEPRO)	0,5 l + 2 l huile SIFREN	Sur graminées annuelles
		1,25 l + 2 l huile Sifren	Sur graminées vivaces au stade 15 à 20 cm et pâturins de 3 feuilles maximum et ray-grass après tallage.
cycloxydime	STRATOS (BASF)	1,25 l + 2 l huile 970	Sur graminées annuelles.
		3 l + 2 l huile 970	Sur graminées vivaces.
propaquizafop	AGIL (LA QUINOLEINE)	1,2 l	Sur graminées annuelles.
		2 l	Sur graminées vivaces.